

## Внедрение технологии возделывания озимых зерновых культур для сухостепной зоны Северного Казахстана

Культура	Сроки посева	Нормы высева, млн.всх. семян на 1 га	Межкулисное пространство – 4,5 м				Внедрение
			Урожай, т/га	Содержание сырой клейковины, %	Себестоимость, рублей 1 т	Рентабельность, %	
<b>Яровая пшеница</b>	20 мая	2,0	1,16	27,0	129	108	Внедрены в ряде хозяйств Целиноградского и Ерейментауского районов Акмолинской области на площади около 2000 га.  Получены акты внедрения и изданы рекомендации производству совместно с учеными Казахского НИИ зернового хозяйства имени А.И.Бараева.
<b>Озимая пшеница</b>	10-15 августа	3,0	1,18	23,5	182	158	
		4,0	1,22	23,8	176	160	
		5,0	1,34	24,0	167	162	
	20-25 августа	3,0	1,33	24,0	155	166	
		4,0	1,39	24,2	148	168	
		5,0	1,45	24,4	146	172	
	30 августа - 5 сентября	3,0	1,58	25,3	143	174	
		4,0	1,76	27,4	139	177	
		5,0	2,51	28,9	137	179	
<b>Трити-кале</b>	10-15 августа	3,0	1,11	20,9	141	160	
		4,0	1,19	21,2	146	163	
		5,0	1,22	21,8	150	166	
	20-25 августа	3,0	1,26	22,0	110	170	
		4,0	1,35	22,2	113	172	
		5,0	1,47	22,7	115	173	
	30 августа - 5 сентября	3,0	1,51	23,7	125	175	
		4,0	1,66	25,1	130	180	
		5,0	1,82	26,2	136	184	