

120 « -10: -  
» - //  
-10: «

- »,  
120-  
. -2014. - .1., .1. - .5-8

• • „  
• • „  
• •

« -2020»,

• ,  
• ,

• , 70%  
• - ,

, [1].  
• ,

• ,  
• ,

48 .  
(10-11 %). 24-26 %

• - ,  
• ,  
3-4  
[2].

202

[3, 4].

290 [5].

« . . . »,

22

30 / .

[6].

2013  
« — »  
126 <sup>1,0</sup> 2, 100 <sup>3,0</sup> 2.

(*Agropyrum pectiniforme*),  
(*Bromopsis inermis*),  
(*Psathyrostaechys junca*), (Festuca ovina),  
(Festuca varia), (*Stipa lessingiana*).  
35%,  
(*Artemisia vulgaris*), (*Artemisia austriaca*),  
(*Artemisia Lercheana*), (*Achillea*  
*millefolium*), (*Chamaecytisus ruthenicus*),  
(*Leontodon autumnalis*), (*Polygonum aviculare*),  
(*Galium verum*), (*Polycnemum arvense*),  
(*Filipendula ulmaria*), (*Centaurea*  
*jacea*). 1 - (*Garex*  
*praecox*).

( 10  
(25-35%), (55 %)  
).

« - »  
3,84%, / , N-NO<sub>3</sub>

1,70 3,50 / ; 2 5 6,60 / ; 2 524 / ; 7,37 8,35,  
1,05 / 3,  
36,4%, 55% , 29%  
16% . -

1,27 2,86  
0,18 0,27 / .

2013 ,

80%.

)

-10 2,2 ,  
1,2 .

:

,

.

,

,

,

.

( )

,

,

,

.

,

,

.