

-3,6

100²,

11

« - » 15-17 , 15

« - » - 13

- 19.

185,9 ,

1 0-100 - 5,2 59

100: 35% - 47 ,

93,3%, -96,2%, 72,7 67,4%.

85,3-95,0%.

- 75,8%, - 70,3%.

123,7

49,8 [1].

34,3-76,1%.

16,8-13,7%.

1 -

(3)

	,%	,	,%				
	100	55,6	-	100	24,4	35,6	40,0
	100	123,7	100	-	12,9	64,4	22,6
+	100+15	107,3+56,4	65,7	34,3	13,9+26,5	66,5+36,6	19,6+36,9
	100+25	104,4+59,	60,4	39,6	14,3+2	61,3+3	24,1+40,6

		6			5,2	4,3	
	100+35	105,8+49,8	62,9	37,1	13,7+27,5	65,8+41,9	20,5+30,6
	85+15	99,2+59,5	69,0	41,0	16,8+25,7	64,2+41,1	19,0+33,0
	75+25	98,2,3+59,5	39,3	60,7	14,4+28,2	62,8+37,9	22,7+34,0
	50+50	86,7+59,2	23,9	76,1	15,3+25,7	65,3+37,6	19,4+36,8

34,2. 100+35% - 137,0 34,4 / 50+50% - 138,6

(15,4-17,7 /) (4,3 /)

[2].

2-

(3)

	1	,%	/ ,		1 ,	
	1,2	100	160,4	37,7	22,0	6,0
	3,0	100	105,8	27,4	12,7	2,6
+	3,0+0,18	100+15	126,6	32,8	14,4	2,9
	3,0+0,30	100+25	127,6	32,5	15,0	3,1
	3,0+0,42	100+35	137,0	34,4	17,7	4,3
	2,55+0,18	85+15	132,7	31,7	15,1	3,0
	2,25+0,30	75+25	127,9	32,6	15,4	3,2
	1,5+0,6	50+50	138,6	34,2	15,4	4,3

25,7%,

20,0%.

20-22%

12,6-20,1%,

9,3-9,7

1

10,0 - 11,1

100+35% 50+50%

3,0 -1,5 . 0,42-0,6 .

1 , ,

1. . . :

2. Aysen UZUN*F.Ferda ASIK. THE EFFECT OF MIXTURE RATES AND CUTTING STAGES ON SOME YIELD AND QUALITY CHARACTERS OF PEA (*Pisum sativum* L.)+OAT (*Avena sativa* L.) MIXTURE. Turkish Journal of Field Crops, 2012, 17(1): 62-66