

C


45

- 1) (*Carabus*):
 - (*Zabrus gibbus* Fabr.=*Z. tenebrioides* Goeze);
 - (*Carabus auratus*);
 - (*Calathus*);
 - (*Nebria*).
- 2) (*Coccinellidae*):
 - 14- (*Propylea quatuordecimpunctata*);
 - (*Coccinella septempunctata*);
 - (*Adalia bipunctata* = *occinellidae*).
- 3) (*Chrysomelidae*):
 - (*Leptinotarsa decemlineata*);
 - (*Cassida nebulosa*);
 - (*Melasoma tremulae*);
 - (*Lochmaea caprea*);
 - (*Chrysomela populi*).
- 4) (*Scarabae*):
 - (*Amphimalon solstitialis*);
 - (*Melolontha hippocastan*);
 - (*Sinodendron cylindricum*);
 - (*Cetonia aurata*);
 - (*Phyllopertha horticola*);
 - (*Anomala dubia*);
 - (*Polyphylla fullo*);
 - (*Protaetia marmorata*);

- (*Hoplia aureola*).
- 5) - (*Curculionidae*):
 - (*Phyllobius viridiaeris*);
 - (*Hylobius abietis*);
 - (*Anthonomus rubi* Hrbst.);
 - (*Furcipes rectirostris* L.);
 - (*Sciaphobus squalidus* Gyll.);
 - (*Sciaphilus asperatus* Bonsd.);
 - (*Tanymecus palliatus* F.);
 - (*Psalidium maxillosum* F.).
- 6) (*Mylabridae*):
 - (*Lytta vesicatoria*).
- 7) (*Hydrophilidae*):
 - (*Hydrophilus piceus*);
 - (*Hypulus*).
- 8) (*Buprestidae*):
 - (***Capnodis tenebrionis***);
 - (*Capnodis cariosa* Pall.);
 - (*Agrilus viridis* L.).
- 9) (*Cerambycidae*):
 - (*Stictoleptura rubra*);
 - (*Rhagium inquisitor*);
 - (*Saperda populnea*);
 - (*Monochamus galloprovincialis* Germ.);
 - (*Acanthocinus aedilis* L.);
 - (*Tenebrionidae*).
- 10) (*Silphidae*):
 - (*Oiceoptoma thoracica*);
 - (*Aclypea opaca*);
 - (*Blaps mortisaga*).
- 11) (*lateridae*):
 - (*Agriotes obscurus*).

– 33 %, – 20 % (1). 47 %,


(*Sciaphobus squalidus* Gyll.),
 (*Anthonomus rubi* Hrbst.),
 (*Furcipes rectirostris* L.),
 (*Hydrophilus piceus*).
 (*Zabrus gibbus* Fabr.=*Z. tenebrioides* Goeze);
 (*Carabus auratus*); (*Calathus*); (*Nebria*).
 (*Hylobius*
abietis), (*Protaetia (Liocola) marmorata*).



1 -

(*Stictoleptura rubra*) [1].
(*Sciaphobus squalidus* Gyll.)

(2).



2 -

(- 42 %),
(*Agrilus viridis* L.),
(*Nebria*),
(*Agriotes obscurus*), (*Calathus*), (*Nebria*),

14-
(*Stictoleptura rubra*) [2].

(*Propylea quatuordecimpunctata*),

Goeze),
(*Phyllobius viridiaeris*),

(*Zabrus gibbus* Fabr.=*Z. tenebrioides*),
(*Carabus auratus*),
(*Leptinotarsa decemlineata*) . .
- 11 %.

(-), , (*Phyllobius viridiaeris*),
[3].

69
45

69 %

14-

1) - 45

2) 47 %, - 33 % - 20 %.

(*Hydrophilus piceus*),
Goeze),
(*Nebria*),
(*Carabus auratus*),
(*Sciaphobus squalidus* Gyll.),
(*Furcipes rectirostris* L.),
(*Zabrus gibbus* Fabr.=*Z. tenebrioides*),
(*Calathus*);
(*Hylobius abietis*)
(*Protaetia (Liocola) marmorata*).

1. . . . - , 2008.
2. Zhantiev R.D. Ecology and classification of dermestid beetles (Coleoptera, Dermestidae) of the Palaearctic fauna Entomological Review. // Entomological Review. 2009.-Vol.89, no.2
3. . . . - , 1970. - 372 .
4. . . . - , 1976.