Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті күніне арналған **«Сейфуллин оқулары – 9:** Жоғарғы білім және ғылым дамуындағы жаңа бағыт» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары = Материалы Республиканской научно- теоретической конференции **«Сейфуллинские чтения – 9:** Новый вектор развития высшего образования и науки**»** посвященная дню Первого Президента Республики Казахстан. – 2013. – Т.2, ч.2 – С. 139-140

ПУШНИНА ЗВЕРЕЙ

Амиреева А.А.

Звероводство — отрасль животноводства по разведению в неволе ценных пушных зверей для получения шкурок.

Пушнина — выделанные шкурки пушных зверей (млекопитающих с ценным мехом), используемые для производства меховых изделий. Пушнина добывается охотой (пушной промысел) или является продукцией звероводческих хозяйств. Как правило, мех является единственной целью охоты, мясо и другие составляющие не используются. Охота и торговля пушниной являлись важными факторами в освоении Сибири и Северной Америки.

Впервые пушное звероводство возникло в XIV веке в северных районах России. Местное население занималось выращиванием с целью получения шкурок выловленного в воли молодняка лисиц и песцов внутри изб и придомовых построек. Параллельно существовала и охота на зверя, которая была намного рентабельней «избяного» звероводства.

Пушной промысел получил развитие в странах и регионах обитания млекопитающих, обладающих ценным мехом. Пушнина, как результат промысла, с древних времён являлась объектом товарно-денежных отношений. В XI — XII вв. в Киевской Руси пушнина служила деньгами, в том числе внешней валютой, средством обмена на драгоценные металлы, в том числе серебро для чеканки монеты (собственное серебро на Руси не добывалось до XVII века). Пушниной с этих времён платилась дань, выдавалось жалованье, она выступала в качестве даров подданным либо иностранным гостям как признак особой благосклонности царей, князей либо других высокопоставленных руководителей.

К пушным зверям, в частности, относятся такие виды как: норка, голубой песец, серебристо-чёрная лисица, нутрия, соболь, речной бобер, шиншиллы и другие животные. Разведение лисиц, песцов и норок экономически эффективно, особенно в современных рыночных отношениях, организовывать вблизи мясокомбинатов, рыбокомбинатов, рыбных промыслов и промыслов морских зверей. Корм для своих животных в виде отходов боенского производства и рыбной промышленности будет в этом случае доступен.

Нутрии менее требовательны к подобного рода кормам, то их разведением сельхозпредприятия занимаются в основном в регионах с хорошо развитым полеводством, дающим концентрированные и сочные корма в необходимых объемах. Разумеется, для разведения нутрий требуется и наличие водоемов, богатых различной водной растительностью: озера, пруды, речки, искусственные водоемы. В регионах с очень сильными морозами нутрию разводить не рекомендуется.

Физиологическое состояние пушных зверей можно разделить на несколько периодов: подготовка к гону; гон; беременность и щенение; выращивание молодняка; период покоя взрослых зверей.

Главное в разведении пушных зверей правильная подготовка и проведение случки. Поэтому к наступлению случки звери должны иметь нормальную упитанность.

У зверей, оставленных на племя, рацион кормления должен быть более полноценным и содержать в достаточном количестве витаминные и минеральные корма. Этот период характеризуется развитием у зверей половых органов. Взрослым самкам после лактации в течение 1015 дней усиливают рацион.

Задача племенной работы в пушном звероводстве состоит в том, чтобы добиться улучшения качества мяса, повышения плодовитости и жизненности животных, а также укрупнения. Для этого используется бонитировка пушных зверей, которая обычно проводится в ноябре месяце (в период полного созревания волосяного покрова) и обязательно в хорошую погоду, при хорошем освещении (в непогоду можно ошибиться в оценке меха).

К первому классу относят зверей самых лучших по качеству опушения, хорошо развитых, крепких и крупных, которые не имеют недостатков в телосложении.

Ко второму классу относят зверей, которые имеют небольшие недостатки в главных качествах меха, меньше по размерам, но с хорошо развитым телосложением.

К третьему классу относят зверей, которые имеют существенные недостатки меха, а также недоразвитых и с ослабленным телосложением.

В сравнении с текстильными материалами, мех имеет наибольшее воздействие по 17 показателям из 18, включая изменение климата, эвтрофикацию и ядовитые выбросы. Во многих случаях воздействие было выше в 2 - 28 раз, чем у других материалов, даже привзятие значений нижней границы производственной цепи.